

İmaj Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhşat Tarih ve No.su: 13.02.2013/9077

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Narenciye	Kanyaş (Gelic)	(Sorghum halepense)	60 ml/da
	Köpekdişi aynıçi	(Cynodon dactylon)	240 ml/da
Bağ *	Kanyaş (Gelic)	(Sorghum halepense)	60 ml/da
	Köpekdişi aynıçi	(Cynodon dactylon)	240 ml/da
Mercimek	Yabani yulaf	(Avena fatua)	45 ml/da
Soğan	Yabani yulaf	(Avena fatua)	45 ml/da
Pamuk	Kanyaş (Gelic)	(Sorghum halepense)	60 ml/da
Soya	Kanyaş (Gelic)	(Sorghum halepense)	60 ml/da
Domates	Kanyaş (Gelic)	(Sorghum halepense)	60 ml/da
Biber	Kanyaş (Gelic)	(Sorghum halepense)	60 ml/da
Karpuz	Kanyaş (Gelic)	(Sorghum halepense)	60 ml/da
Yerfıstığı	Kanyaş (Gelic)	(Sorghum halepense)	60 ml/da
Şekerpancarı	Yabani yulaf	(Avena fatua)	60 ml/da
	Darıcan	(Echinochloa crus-galli)	
	Tılıkuyruğu	(Alopecurus myosuroides)	
	Yumuşak başaklı kuşyemi	(Phalaris paradoxa)	
	Tavşanbığı	(Poa annua)	
	Delice	(Lolium temulentum)	
	Ayrık	(Elymus repens)	

* Tüketim amaçlı bağı yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam ederek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hizmeti memle kullanılmıştır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmışmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini değiştirerek tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayın. Yıkama suyunu ve atılan su kaynaklarına boşaltmayız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

SUPER KOLENT ile en iyi ve kesin netice yabancı otların 15-20 cm boyunda, 5-6 yapraklı devresinde kullanıldığından alınır. İlk tatbikattan 20-25 gün sonra aynı dozda yapılan ikinci tatbikatta tarla da yeni çiğlenen yabancı otlarda kontrol edilir. Köpekdişi aynıçi için tek tatbikat yeterlidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SUPER KOLENT adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaların, direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için SUPER KOLENT'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereklili durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılması tavsiye edilmez.

02 Nisan 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Ümit Uğur BAHÇE
Daire Başkan V.



Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu A,1 Herbisit (Yabancı ot İlacı)

108 g/l Haloxyp-P-methyl ester

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR SEY YEMEYİNİZ, İÇMЕYİN, SIGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMİR İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve görmede bulanıklık görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

Ilaç temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla buluşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTO VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Haloxyp-P-methyl ester
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



Uyarı kelimesi : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukları erişmeyeceği yerde saklayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

P501: İçeriği kabı ulusal yönetimeliklere göre bertaraf edin. EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanım talimatlarını uygun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDILECEK HUSUSLAR:

- Anlara zehirlidir, çıraklınen dönemde kullanmayın.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulatabırmayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayın.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Uygulamalar yağışsız ve sakin günlerde yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kurut) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavyışlere uymadıklarında eksiksiz neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumlu kabal etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ali Evrin cad. Polaris Plaza Apt No: 21/26

Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısmı 1.Cadde

No: 36 Dömealtı /ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

