

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su : 30.12.2015 / 10476

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Dönemi
Buğday	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Kokar ot (<i>Bifora radians</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) İtalyan çimi (<i>Lolium multiflorum</i>) Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>) Yabani fiğ (<i>Vicia spp.</i>)	25 gr/da + 100 ml *Bioman	Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.
	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kısa başaklı kuşyemi (<i>Phalaris brachystachys</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)	30 gr/da + 100 ml *Bioman	

*Bioman yayıcı-yapıştırıcıdır. Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka ROSTEAM ile birlikte kullanılmalıdır.

ROSTEAM, buğday tarlalarında sorun olan yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otları çıkış sonrası (Post-emergence) kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. **ROSTEAM**, sistemik bir ilaç olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alımını durur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürlür. Ölümler tırlara ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk hava ve aşırı yağışın neden olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
10 Aralık 2020



ROSTEAM

Suda Dağılıbilir Granül (WG)

Grubu	B;2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	--------------------------------

% 3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl-sodium + %9 Mefenpyr-diethyl (safener)

Önce Etiket Okuyunuz.

Evde Kullanmayınız.

Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.


Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.

Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.

İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL (UZEM) : 114



Net Miktarı:
Brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Mesosulfuron-methyl + Iodosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr-diethyl (safener)
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



Uyarı kelimesi : **DİKKAT**

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçının
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın
P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Komşu tarlalara direkt veya indirekt temastan kaçınınız.
- Tıkanmış adaptörleri ağızınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

PLATIN KİMYA
Mühürsellik ve Dış Tic. A.Ş.
AYŞE TÜMAY
Ziraat Yüksek Mühendisi

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Motorlu sırt atomizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm olmalıdır.

Bio-man yayıcı-yapıştırıcıdır. Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka ROSTEAM ile birlikte kullanılmalıdır. Bio-man'ın kullanım dozu dekara 100 ml'dir.

İkinci Ürün Ekiminde Dikkat Edilecek Hususlar:

Pamuk ve soya emniyetle ekilebilir.

Kuruya mısır ekilecekse tarlanın mutlaka derin sürülmesi gereklidir.

Diğer ürünler için mutlaka firmaya danışınız.


Münavebe Ürünlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

ROSTEAM, kullanılan tarlalarda buğdaydan sonra mercimek ekilmemelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ: ROSTEAM adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B;2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ROSTEAM 'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B;2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa, ön karışım testi yapılması önerilir.

**ROSTEAM****Suda Dağılabilir Granül (WG)**

Grubu	B;2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	--------------------------------

% 3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl-sodium + %9 Mefenpyr-diethyl (safener)

ZEHIRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

Yutulması halinde; Yutulması halinde doktora başvurunuz. 1-2 bardak su içiriniz, kusturmaya çalışmayınız. Bilinçsiz hastaya ağızdan bir şey vermeyiniz.

Göz ile temas halinde; Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde; İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde; Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekiyorsa oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL (UZEM) : 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitk koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitk koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbik veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:


PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

10 Aralık 2020





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ
RUHSAT BELGESİ**

İMAL

Ruhsat No:	10476	Ruhsat Tarihi:	30.12.2015
Ticari Adı		: ROSTEAM	
Grubu		: Herbisit	
Aktif Madde ve Oranı		: %3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9 Mefenpeyr-diethyl (safener)	
Formülasyon Şekli		: WG (Suda Dağılılabilen Granül)	
Görünüşü		: Kahve Renkli Granül	
Ruhsat Sahibi Firma Adı ve Adresi		: PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC. A.Ş. Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza Apt. No:21/26 Sarıyer / İSTANBUL	
Üretici Firmanın Adı ve Adresi		: PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİCARET A.Ş. Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1 Kısım 1.cadde No:38 Döşemealtı / ANTALYA	
Üretim Tesisinin, Üretim			
İzin Tarih ve Numarası		: 11.07.2014/21-316	
Ruhsat Belgesinin Geçerli Olduğu Süre		: 30.12.2025 (Otuz Aralık İkibinyirmibeş)	
Düzenlenme Tarihi ve Nedeni		tarhine kadar : 18.03.2019, Ruhsat Sahibi Firma Adres Değişikliği, Ruhsat Sahibi Firma Ünvan Değişikliği, Üretim Tesisi Ünvan Değişikliği	

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.




Mümtaz SİNAN
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.