

22 Kasım 2017

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su deposuna ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

CANSA RANİDAP 48 SL, yabancı otların yukarıda belirtilen uygun dönemlerinde ve iyi bir kaplama yapılacak şekilde uygulanmalıdır. İlaçlama yapıldıktan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanır. İlaçlama yapılan yerde 3-4 gün toprak işlenmesi yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

CANSA RANİDAP 48 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G9 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı yerde aynı herbisit veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hâkim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta farklı grupların (Grup G9 harici) ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı otlarda direnç gelişmesini geciktirir veya engeller.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Genellikle diğer ilaçlarla karıştırılmaz. Kalıcı (residüel) ilaçlar **CANSA RANİDAP 48 SL** uygulamasından 7-14 gün önce veya sonra uygulanmalıdır.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

CANSA RANİDAP 48 SL**SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)**

GRUBU	G9	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	----	--------------------------------

480 g/l Glyphosate Isopropylamin tuzu

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Hastanın bilinci kapalıysa kusturmayınız. Bilinci açıksa sabunlu veya tuzlu su ile kusturunuz. Tıbbi yardım alınız. İlaç etiket ve ambalajını birlikte götürünüz.

Cilt ile teması halinde: Elb-selerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Solunması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- *Uygulama esnasında sigara içmeyiniz ve herhangi bir şey yemeyiniz.
- *Uygulama sırasında, ilacın tavsiye edilmediği bitkilere bulaşmasına mani olunuz.
- *Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- *Arılara zehirlidir. Arıların faaliyette olduğu özellikle çiçeklenme zamanında ilaçlama yapılmadan önce yakın mahaldeki kovan sahiplerinin uyarılmasında yarar vardır.
- *Akarsulara bulaştırmayınız.
- *İlaçla temastan kaçınınız.
- *İlaçla bulaşık giysilerinizi değiştiriniz.
- *İçinde ilaç kalmış ambalajları ağız kapalı, gıdalardan uzak ve çocukların erişemeyeceği yerlerde kilit altında muhafaza ediniz.
- *Çinko ve galvanizli metal kapları, ilaç hazırlarken ve muhafaza ederken kullanmayınız.
- *Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma ilacın etikette önerildiği konularda, önerildiği şekil zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. İlacın yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Istanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel (0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

Gülseren BİLGİLİ
SORUMLU MÜDÜR

Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.S.B. Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL



22 Kasım 2017