

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO : 30.03.2006 / 5455
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
BAĞ*	Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da. Köpekdişi ayrığı 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşle iken
DOMATES	Köpekdişi ayrığı(<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, çıkış sonrası
AYÇİÇEĞİ	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yabancı arpa (<i>Hordeum spontaneum</i>) Yabancı darı (<i>Panicum spp.</i>) Çayır püskülü (<i>Poa spp.</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria spp.</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası.
SOĞAN	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan darı (<i>Setaria spp.</i>)	100 ml/da Soğan 15-20 cm boyunda, kanyaş 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darı 10-15 cm boyunda iken
KIRMIZI MERCİMEK	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
	Ayrık (<i>Elymus repens</i>)	100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
ŞEKER PANCARI	Yabancı yulaf (<i>Avena fatua</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>)	75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
PAMUK	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	75-100 ml/da Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
SOYA FASULYESİ	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yabancı darı(<i>Panicum spp.</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kuşyemi (<i>Phalaris spp.</i>)	100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

03 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

CANSASİPER

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	A,1	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	-----	--------------------------------

50 g/l Quizalofop-P-ethyl

-ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
-EVDE KULLANMAYINIZ.
-ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ YÜZÜ YAPILANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
-İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE
SATIŞ FİYATI (K.D.V.DAHLİ) :

İÇİNDEKİLER:

Quizalofop-p-ethyl, Aromatik Hidrokarbon

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226:Alevlenir sıvı ve buhar.
H312+H332:Cilt ile temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H315:Cilt tahrişine yol açar.
H411:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P210:Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.



Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR

cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.B.S. Mh. Akas Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.) yabancı otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

CANSASİPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalar, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **CANSASİPER**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa, ön karışım testi yapılmalıdır.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

CANSASİPER

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	A,1	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	-----	--------------------------------

50 g/l Quizalofop-P-ethyl

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile temas halinde; 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde; Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. Hastanın bilinci açık ise süt veya su içirip derhal doktora götürülmelidir.

Cilt ile temas halinde; Cilde temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın.

Solunması halinde; Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- *Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- *Ürünü serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- *Ürünü kendi ambalajında ağız kapalı olarak saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özel iklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Firma bitki koruma ürününün yanlış kullanımından ve bitki koruma ürününün uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez. İhtilaflardan doğacak kanuni işlemlerde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

cansa

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.
Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

03 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

T.C.
Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sabahattin SAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.S.B. Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı Y.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL.