

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH ve NO : 05.05.2014 / 9648

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDA GEÇEN SÜRE
ELMA	Avrupa Kırmızı Örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	37,5 gr / 100 l su	7 gün
	Akdiken Akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	30 gr / 100 l su	7 gün
ARMUT	Armut Psillası (<i>Cacopsylla pyri</i>)	100 gr / 100 l su	7 gün
FASÜLYE	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	75 gr / 100 l su	7 gün
*BAĞ	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 gr / 100 l su	7 gün
ÇİLEK	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 gr / 100 l su	7 gün
PAMUK	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)	60 g / da	7 gün
KARANFİL	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 gr / 100 l su	7 gün
GÜL	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 gr / 100 l su	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

cansa

ERMOT

AKARİSİT+İNSEKTİSİT

(Kırmızı Örümcek ve Böcek İlacı)

ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU

21 A

AKARİSİT+İNSEKTİSİT

% 20 Tebufenpyrad

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ciltte hafif kaşıntı yapabilir.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ :
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:

Tebufenpyrad

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H302:Yutulması halinde zararlıdır.

H332:Solunması halinde zararlıdır.

H410:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

P270:Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.

P301+P310:Yutulması halinde:Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P280:Korucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P332+P313:Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P304+P340:SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz hava çıkartın, ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P273:Çevreye verilmesinden kaçının.

P362:Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P405:Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı temiz bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Temas ve mide yoluyla etkili, aynı zamanda translaminar özelliğe sahip bir akaristtir. Kırmızı örümceklerin larva, nimf ve erginlerini kontrol eder. İlaçlamalar zamanında yapılmalı, geç kalınmamalı ve mevsim içerisinde aynı etki şekline sahip ilaçla ikiden fazla ilaçlama yapılmamalıdır. Böylece hem ilacın uzun süre kalıcı etkisinden yararlanılmış olur, hem de direnç oluşumu engellenmiş olur.

Fasulye: Yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğu ilaçlama yapılmalıdır.

Çilek: Çiçek ve yeşil meyve döneminde kırmızı örümcekler görüldüğünde erken dönem uygulaması yapılmalıdır.

Elma: Yaprak başına 8-10 adet kırmızı örümcek bulunduğu ilaçlama yapılmalıdır.

Armut: 2. ve 3. dönem nimflerin görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15'inden fazla bulaşma olduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ: Yaprak başına 5- 8 adet kırmızı örümcek bulunduğu ilaçlama yapılmalıdır.

Pamuk: Yaprak başına Akdeniz bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 adet kırmızı örümcek bulunduğu ilaçlama yapılmalıdır.

Karanfil: İlaç bitkilere çiçeklenmeden önce veya çiçek kesiminden sonra uygulanmalıdır. Bir yaprakta ortalama 10 adet kırmızı örümcek bulunduğu ilaçlama yapılır. Tek uygulama yeterlidir. İlaçlamalar sırasında %0,2 oranında yayıcı-yapıştırıcı kullanılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ERMOT adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21A olarak sınıflandırılmış bir akarisit + insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ERMOT**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21 A harici) aynı ilaç yerine zararlıya karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Kuvvetli alkali özellik gösteren ilaçlarla karışmaz. Diğer ilaçlarla karıştırılmak isteniyorsa bir ön karışım testi yapılmalıdır.

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

cansa

ERMOT

AKARİSİT+İNSEKTİSİT
(Kırmızı Örümcek ve Böcek İlacı)

İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	21 A	AKARİSİT+İNSEKTİSİT
-------	------	---------------------

% 20 Tebufenpyrad

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

GÖZ: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Gözlerinizi ovmayın. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

YUTMA: Ağız çalkalayın ve sonra bol su içirin. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. Hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gösteriniz

CİLT: Cilde temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

SOLUMA: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Nefes almakta güçlük çekiliyorsa derhal suni teneffüs yaptırılır. Şikayet devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:

Ciltte hafif kaşıntı yapılabilir.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114
(SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ)

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

*Boş ilaç ambalajlarını başka maksatla kullanmayın. Usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr