

İmal Tarihi :
Son kullanma Tarihi :
Şarj No :

Ruhşat tarih ve No.su : 02.10.2012/8858

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Zararlı Organizme Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Mısır	İmampamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) Hint kenevirsi (<i>Corchorus olitorius</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Beneşli darıcan (<i>Echinochloa colostrum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yabani bamyası (<i>Hibiscus trionum</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	200 ml/da Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.

FTIPP mısır tarlalarında dar (yıllık ve çok yıllık) ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası uygulanan sistemik bir ilaçtır. FTIPP (Foramsulfuron 22,5 g/l) uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasi ile bünyeye alınıp yabancı otun içine taşıılır. Çok yıllık çimensi otlarda, özellikle Kanyaş'ta (gelici) rizomları kadar ilerler. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alımı durur. Böylece mısır bitkisiyle rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deformel olurlar ve sonunda kuruyarak ölürlüler. Ölümler türlerle ve büyümeye şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içinde olur.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günde serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON :

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

26 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAPUL EDİLMİŞTİR

Platin Kimya
FTIPP

Süsponsiyon Konsantre (SC)

Grubu B,2 HERBİSİT(Yabancı Ot İlacı)

22,5 g/l Foramsulfuron

Önce Etiketi Okuyunuz.

Evde Kullanmayın.

Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.

Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayın.

Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayın.

İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan Ürünün Boş Ambalajlarının İçine 1/4'üne Kadar Temiz Su Koyarak İyice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu İlaçlama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ UZEM TEL: 114



Net Miktarı :
Azami perakende satış fiyatı :
İÇİNDEKİLER
Foramsulfuron
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



Uyarı kelimesi : DİKKAT
ZARARLILIK İFADELERİ
Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekim arayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayın.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

-Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayın.

-Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

-Tikanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız fırça ile temizleyiniz.

-Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayın. Komşu tarlalarla direkt veya indirekt temasından kaçınınız.

-İlaç mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz.

-Uygulama yapılan alanlarda hayvanı olatmayın. Bitki artıklarını hayvanlara yedirmeyiniz.

SÜLEYMAN ARSLAN
Platin Kimya
Mümessilik ve Diş Ticaret A.Ş.

İLAÇLAMA MAKINESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Motorlu sırt atomizörü hariç her çeşit aletle kullanılabilir. Kullanılan su miktarı dekra 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanılmalıdır (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. Bitki koruma tırının uygulanmasından önce veya sonra organikfosforlu insektisitler kullanıldığındá Grüne zarar verebilir. 5°C nin altında ve 30°C nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmayızağlız. İlaçlamadan 4-5 saat sonra yağışlardan ilaç etkilenmez. Aşırı stres koşullarında (kuraklık, su birkimesi v.s.) ilaçlamayı erteleyiniz.

Uygulama dönemi: Misirin 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.

DİRENÇ YÖNETİMİ :

FTIPP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbistir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için FTIPP 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayızağlız. Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B, 2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



Süsponsiyon Konsantre (SC)

Grubu	B,2	HERBİSİT(Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	----------------------------

22.5 g/l Foramsulfuron

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mükemmelse etiketi gösterin).

Yutulması halinde; Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde; Göze değişmiş en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde; İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde; Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekiyorsa oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ UZEM TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEVANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi I.Kısim 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Suna ARSLAN
Tıbbi Müşavirliği

Platin Kimya
Mümessilik ve Diş Ticaret A.Ş

26 Şubat 2019
TAİMMÜTE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

