

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su : 29.01.2014/9486

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki Süre
*Bağ	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	40 ml /100 L su (yumurta, larva)	7 gün
Biber (sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	60 ml/da (larva)	1 gün
Domates (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	50 ml/ da (Larva)	1 gün
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	60 ml/100 L su (larva)	14 gün
Pamuk	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	37.5 ml/da (2. ve 3.dönem larva)	21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON : Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Platin Kimya
PACODITY 240 SC
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	18A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	-----	-----------------------------

240 g/L Methoxyfenozide

Önce etiketi okuyunuz

Eyde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız. Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözleri tahriş edebilir. Deride tahrişi daha hafiftir.

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :
İÇİNDEKİLER
Methoxyfenozide
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT ZARARLILIK İFADELERİ

H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

H402 Sucul ortamda zararlıdır

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz

koruyucu/ylüz koruyucu kullanın

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Balıklara ve suda yaşayan diğer canlılara zehirlidir. Bitki koruma ürünün artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız. Boş ürün ambalajlarını hiç bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

07 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



**Platin Kimya**
Mühürsüzlük ve Dış Ticaret A.Ş.
SÜRE AKSEAN
Zararlı Yönetim

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yapılır. Elma içkurduna mücadelesinde hedef, her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin ve uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış, düşmeye başlanmalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 250 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıç döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Domateste (sera) pamuk yaprak kurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacaktır. Uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Biberde (sera) yeşil kurtu karşı alana köşegenler yönünde girilip, alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuşsa uygulama yapılır. İyi bir netice almak için tavsiye edilen dozda kullanılması şarttır.

- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

- pH' 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Pacodity 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre GRUP 18A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik eder. Bu nedenle, direnç gelişimini engellemek için **Pacodity 240 SC** isimli bitki koruma ürünü bir sezon içerisinde önerilende daha fazla uygulamayınız. Uygulanmanın gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (GRUP 18A dışındaki) bitki koruma ürünlerini kullanmaya özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir karışım testi yapılması tavsiye edilir.

 Platin Kimya
PACODITY 240 SC
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	18A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	-----	-----------------------------

240 g/L. Methoxyfenozide

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

Bitki koruma ürünü ile temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Spesifik antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM): 114

Özellikleri

- **Pacodity 240** se kelebek larvalarına karşı etkili bir bitki koruma ürünüdür.
- Mide yolu ile haşerelere etki eder.
- Solvent ihtiva etmez.
- Kullanıldığı ürünlere emniyetlidir.
- Suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir.
- Sudaki canlılara zehirlidir. Her türlü su kaynağına, akarsu ve göllere bulaştırılmamalı, bitki koruma ürünü dökülmemelidir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş.
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26

Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

07 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.


Ömit Uğur BAHCE
Daire Başkanı


Sinan ARSLAN
Müessellik ve Dış Ticaret A.Ş.