

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH VE NO.SU : 24.12.2015 / 10465
KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	105 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf, ergin)	7 gün
DOMATES (SERA)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	80 ml/100 l su (larva, nimf, ergin)	3 gün
PATLİCAN (SERA)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	80 ml/100 l su (larva, nimf, ergin)	3 gün
KRİZANTEM (SERA)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	100 ml/100 l su (nimf, ergin)	-
ÇİLEK(SERA)	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	80 ml/100 l su (larva, nimf, ergin)	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

PANULA 20 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	25	AKARİSİT (KIRMIZIÖRÜMCEK İLACI)
-------	----	------------------------------------

200 g/l Cyflumetofen

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ ¼'Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:
Cyflumetofen

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P363: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501: İçeriği kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

Sezayi İSTEK
SORUMLU MÜDÜR

14-12-2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma- Kırmızıörümcek: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates (Sera) ve Patlıcan (Sera) -Kırmızıörümcek: Parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. Dekar başına domateste 20 yaprakta ortalama 3 adet canlı kırmızı örümcek, patlıcanda 10 yaprakta ortalama 5 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğu mücadeleye karar verilir.

Krizantem (Süs Bitkisi)- Kırmızıörümcek: Sık sık bitkilerin özellikle alt yaprakları kontrol edilir. Lokal zarar var ise lokal ilaçlama, yaygın zarar var ise alanın tamamı ilaçlanır.

Çilek – Kırmızıörümcek : Erken dönem uygulaması : Sorun olan çilek alanlarında,çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızı örümcekler görüldüğünde tek uygulama yapılır.Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması yönünden daha güvenlidir.Mevsim içi uygulaması : Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir.Kırmızıörümcekler çiçekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür.Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulama yapılması yeterlidir.Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkilerin orta ve alt bölümlerinden en az 50 yaprakçık incelenir.Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir.Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır.Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

PANULA 20 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 25 olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PANULA 20 SC** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 25 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

PANULA 20 SC 'nin diğer ürünlerle karıştırılmadan yalnız başına kullanılması önerilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

PANULA 20 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	25	AKARİSİT (KIRMIZIÖRÜMCEK İLACI)
-------	----	------------------------------------

200 g/l Cyflumetofen

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile temas halinde; 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde; Ağzı bol suyla yıkanmalı ve çok iyi çalkalanarak durulanmalıdır. Hastaya 240-300 ml su içmesi sağlanarak kusturulmalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilemez. Derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Cilt ile temas halinde; Elbiseleri çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır. Ayrıca Bkz. Önlem İfadeleri P333+P313 ve P363.

Solunması halinde; Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayın.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Hazırlanan bitki koruma ürünü karışımı bekletmeyin, hemen uygulayın.
- Uygulamadan ve bitki koruma ürünü su bitki üzerin kuruduktan sonraki 1 saat içinde yıkayıcı yağış olm. durumunda uygulamanın tekrarı gerekir.
- Ürünü orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak, havalandırılan ortamlarda, ortam sıcaklığı 0°C'nin üstünde 40°C'nin altında olacak şekilde depolayın. Nemden doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajın açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Fakat depolama uygulama kontrolümüz dışında olduğundan uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA:

OAT Agrio Co., Ltd.
1-3-*, Kanda Ogawa-machi, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0052, JAPONYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

14-12-2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Sezayi İSTEK
SORUMLU MÜDÜR