

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No: 13.02.2013/9084

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki ADI	Zararlı Organizma ADI	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	25 ml / 100 L su (yumurta, larva, nimf)	14 gün
Domates	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml / 100 L su (Larva, Nimf)	3 gün
Pamuk	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml / da (Yumurta, larva, nimf)	21 gün
	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml / da (Yumurta, Larva, Nimf)	21 gün
Karpuz	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml / da (Larva, Nimf)	3 gün
*Bağ	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml / 100L su (Yumurta, Larva, Nimf)	7 gün
Çilek (tarla)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml / 100 L su (Larva, Nimf)	3 gün
Hıyar (tarla, sera)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml / 100 L su (Larva, Nimf)	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



PlatinKimya

SUUM 10 SC SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	10B	AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı)
------	-----	-------------------------------------

110 g/l Etoxazole

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün İnsan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Adımlarda düzensizlik, kol ve bacaklarda paraliz, düzensiz nefes alma, gözlerden yaş akması, idrar kaçırma, ishal gözlenmiştir.
(Bu gözlemler 3500 mg/kg'dan yüksek doz verilen sıçanlarda saptanmıştır)

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) : 114

22 Subat 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

NET MİKTARI :
BRUT AĞIRLIĞI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :
İÇİNDEKİLER :
Etoxazole
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız
Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz
Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız usulüne uygun olarak imha ediniz.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ

Şuna ARSLAN
Ziraat Mühendisi
Platin Kimya
Nüfus Sicil ve Ticaret A.Ş.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ÖZELLİKLERİ: Kontakt etkili akaristittir. Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değişimlerini engellemek suretiyle etki gösterir. Erginlere etkili değildir. Bununla birlikte uygulamadan 3-5 gün sonra belirgin etkisini gösterir ve etki devamlılığı bir ay civarındadır.

Elma-avrupa kırmızıörümceği:

Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates, hıyar, biber kırmızı örümcek: domates ve hıyarda yaprak başına ortalama 3-5 adet biberde 1-3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Pamuk kırmızıörümcek: Mücadele zamanın belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Karpuz iki noktalı kırmızıörümcek: Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Yaprakları üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adetine bölünür. bir yaprağa düşen kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye devam edilir.

Bağ -iki noktalı kırmızıörümcek: Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda zararlı yoğunluğu eşiğin üzerine çıkarsa, ikinci uygulama yapılır. hasattan önce yapılan uygulamalarda kullanılan akaristit bekleme süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonrada uygulama yapılabilir.

Çilek iki noktalı kırmızıörümcekler:

Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında, çilek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeye başlamadan önce) kırmızıörümcek görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda açıkta yetiştirilen çilek alanlarında yapraklar mevsim başında, (Mart sonu - Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir.

Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edilecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yapraklık incelenir. Yaprak başına 15 üzerinde kırmızıörümcek tespit edilirse halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

**SUUM 10 SC
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)**

GRUP	10B	AKARİSİT (kırmızı örümcek ilacı)
------	-----	-------------------------------------

110 g/l Etoxazole

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :**Yutulması halinde**

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

Ürünle temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekirse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

22 Subat 2019

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.**

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş.

Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde

No: 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Platin Kimya
Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.

ŞİNA ARSLAN
Genel Müdür

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

SUUM 10 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10 B olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için **SUUM 10 SC** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 10B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali özelliktekiler hariç, diğer insektisit-, funtisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir. Uygulama için çoğularda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

**SUUM 10 SC**
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	10B	AKARİSİT (kırmızı örümcek ilacı)
------	-----	-------------------------------------

110 g/l Etoxazole

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:
PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78
ÜRETİM TESİSİ:
PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Platin Kimya
Müessellik ve Dış Ticaret A.Ş.

Yusuf ARSLAN
Ticaret Mühendisi

AS N

Uğur Uğur BAĞÇE
Başkan V.

22 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.