

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH ve NO : 07.01.2015 / 10017

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ:

CANSUPRAN, çıkış sonrası (post-emergens) olarak kullanılan seçici özellikte sistemik bir herbisit olup buğday ve arpada tek ve çok yıllık geniş yapraklı yabancıotların mücadelesinde kullanılır. Dicamba, yabancıotların aktif olarak büyüyen kısımları ile alınarak tüm bitkide büyüme noktalarına taşınır ve embriyonik hücrelerde birikir. 2,4-D ise selektif sistemik bir herbisit olup yabancıotların yine aktif büyüyen kısımları ile bitkiye alınarak gövde ve köklerin meristematik bölgelerinde birikirler, büyüme inhibitörü olarak davranırlar.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
BUĞDAY	Peygamber çiçeği (<i>Centaurea depressa</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Boz tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus galaticus</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricornutum</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Sarı taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>) Meryem dikenini (<i>Silybum marianum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>)	100 ml / da (Çıkış sonrası)
ARPA	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Peygamber çiçeği (<i>Centaurea depressa</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>)	100 ml / da (Çıkış sonrası)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli menar kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

04 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

(Firma adı: CANS A Kimya San. ve Tic. L. Şti.)

cansa

CANSUPRAN

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	O;O	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	-----	--------------------------------

344 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amonyum tuzu + 120 g/l Dicamba

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ ¼'Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :
(K.D.V. DAHİL)

İÇİNDEKİLER:

2,4 D, Dicamba

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302:Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

H318:Ciddi göz hasarına yol açar.

H411:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102:Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

P270:Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405:Kilit altında saklayın.

P501:İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.



Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.S.B. Molek Aras Bulvarı
No: 39 34966 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yatırım: V.D. 202 001 2827
Sermaye: 3.100.000 TL.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama Zamanı:

CANSUPRAN, yabancı otlar çıktıktan sonra kardeşlenme döneminde ılık ve nemli havada uygulanmalıdır. Mücadeleden en iyi sonucu alabilmek için, yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu (rozetler 5 cm'den küçük) genç dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Aşırı kurak veya don beklendiğinde ve yabancı otların strese olduğu dönemlerde ilaçlamadan kaçınılmalıdır, ilacın performansı düşebilir. En iyi sonuç buğday, arpa ve yabancı otların aktif büyüme dönemlerinde olduğu erken uygulamalardan elde edilir.

Bitki Tahammülü:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday ve arpa tarafından çok iyi tolere edilir. Geç uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Münavebe Esnekliği:

CANSUPRAN, toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktaki etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebeye girecek kültür bitkilerine herhangi bir fitotoksitesi yoktur.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

CANSUPRAN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O;O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CANSUPRAN'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O;O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa, ön karışım testi yapılmalıdır.

(Firma adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

CANSUPRAN

SUDA ÇÖZÜLEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	O;O	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	-----	--------------------------------

344 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amonyum tuzu + 120 g/l Dicamba

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Hastayı kusturmaya çalışmayın. Hastayı ilaç ve ambalajını derhal doktora gönderiniz. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

Cilt ile teması halinde: Elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Solunması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. İlacın sindirildiğinden şüphelenilirse mide ılık su ile yıkayarak (tuzlu su alınmasını takiben) boşaltılmalıdır. Aşırı titremesi olan veya bilincini kaybetmiş kişileri kusturmayınız ve hiçbir sıvı vermeyiniz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- *Yeni ilaçlanmış sahalardan ot almayınız, hayvanları otlatmayınız.
- *İlaç karışımını ihtiyaç kadar hazırlayınız. İhtiyaç fazlası ilaçlı mahlül kalırsa, on misli su ile seyrelterek ilaçlanmış araziye veya nadas araziye püskürtünüz. Yıkama suyunu nadas araziye püskürtünüz.
- *Rüzgârlı havalarda 28°C'yi geçer ise daha serin olan akşam saatlerinde uygulama yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma ilacın etikette önerildiği konularda, önerildiği şekil zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. İlacın yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlar ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

04 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.3.B. Melek Aras Bulvarı
No: 39 / 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2027
Sermayesi: 3.100.000 TL.