

İMAL TARİHİ
SON KULLANMA TARİHİ
ŞARJ NO.
RUHSAT TARİH ve NO.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

CANOXYDİM 240 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarla kendi gelen (buğday- arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra, yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki içinde hareket ederek köklere kadar taşınır. Kanyaş gibi çok yıllık otlarda rizomları tamamen kurutur ve yeni sürgün vermesini önler.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE	YAYICI YAPIŞTIRICI
ŞEKER PANCARI PAMUK, MERCİMEK, SOĞAN, SOYA FASULYESİ, FASULYE	Yıllık Çimensi Otlar: Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yabani yulaf (<i>Avena spp.</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Kaz çimi (<i>Eleusine indica</i>) İnce delice (<i>Lolium rigidum</i>)	40 -50 ml/da	60 gün	1 kısım ilaca, 2 kısım yayıcı yapıştırıcı ilave ediniz. İlacı mutlaka yayıcı yapıştırıcı ile birlikte kullanınız.
	Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	30-40 ml/da		
	Çok Yıllık Otlar: Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	80 ml/da		
KİMYON	Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) İnce delice (<i>Lolium rigidum</i>) Adi salkım otu (<i>Poa trivialis</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Yeşil kirpi darı (<i>Setaria viridis</i>)	30 ml/da	60 gün	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kayraklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

03 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

CANOXYDİM 240 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	A,1	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	-----	-----------------------------

240 g/l Clethodim

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜN UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ ¼'Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ :
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:

Clethodim, Aromatik Hidrokarbon.

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.



Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. OSB Menek Aras Bulvarı
No: 39 - 34956 Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

CANOXYDİM 240 EC çıkış sonrası, yabancıotların genç ve aktif büyüme dönemlerinde kullanılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancıotların kuraklık, soğuk v.b. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

CANOXYDİM 240 EC adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **CANOXYDİM 240 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

ÜRÜN ROTASYONU:

Toprakta çok çabuk bozunduğundan, **CANOXYDİM 240 EC** uygulanan tarlada bir sonraki ürün olarak her türlü kültür bitkisi yetiştirilebilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa, ön karışım testi yapılmalıdır. Bulunabilirse en az %80 mineral yağ veya bitkisel yağ + en az %15 emülgatör içeren yayıcı -yapıştırıcılarla birlikte kullanılması tavsiye edilir. Bu özelliklere uymayan yayıcı-yapıştırıcı maddelerle karıştırılmamalıdır.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

CANOXYDİM 240 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	A,1	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	-----	--------------------------------

240 g/l Clethodim

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Doktora başvurulmalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. Hastanın bilinci açık ise süt veya su içirip derhal doktora götürülmelidir

Cilt ile teması halinde: Elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Solunması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- *İlacı yayıcı - yapıştırıcı ile birlikte kullanınız.
- *Tıkanmış memeleri ağızınızla üfleyerek açmayınız.
- *Fırça ile temizleyiniz.
- *İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- *Her ilaçlamadan sonra aletinizi temizlemeden diğer zirai mücadele işlerinde kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma, ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydı ile kalitesini garanti eder. Ancak ilacın hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik nedeniyle oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

03 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. Böl. Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Sermaye: 3.100.000 TL