

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH ve NO : 03.09.2015 / 10338
KULLANILACAK İTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PAMUK	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml / da	21 gün
	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	yum.rta, nimf, ergin	
DOMATES	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / 100 l su	3 gün
	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	nimf, ergin	
	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	60 ml / 100 l larva, nimf	
PATLICAN (TARLA)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / da	3 gün
	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	nimf, ergin	
KARPUZ	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / da	3 gün
	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	nimf, ergin	
ÇİLEK	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / 100 l su	3 gün
	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	nimf, ergin	
HIYAR (SERA)	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml / 100 l su	3 gün
BİBER (SERA)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / 100 l su	3 gün
KORNIŞON (SERA)	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml / 100 l su	3 gün
KARANFİL (SERA)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / 100 l su	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd.Şti.

cansa

ORENTAL

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	23	AKARİSİT (KIRMIZIÖRÜMCEK İLACI)
-------	----	---------------------------------

240 g/l Spiromesifen

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 12 SAAT İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :
(KDV Dahil)

İÇİNDEKİLER:
Spiromesifen

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan

önce yıkayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz..

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

Sezayi İSTEK
SORUMLU MÜDÜR

05-01-2023
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarınıın yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamuk-Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu B5gesine 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Domates, Hıyar, Biber(sera), Kornişon Patlıcan- Kırmızıörümcekler: Domates, hıyar,kornişon ve patlıcan'da yaprak başına ortalama 5-5, biberde 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Domates-Tütün beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunca kimyasal mücadele uygulanır.

Karpuz-Kırmızıörümcekler: Sebze bahçe'lerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adedine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğu müdahaleye karar verilir.

Çilek-Kırmızıörümcekler:

Erken dönem uygulaması: sorun olan çilek alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde tek uygulama yapılır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması yönünden daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Populasyonun yaygınlaşarak göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkilerin orta ve alt alt bölümlerinden en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Karanfil (Sera)-İki noktalı kırmızıörümcek: Süs bitkisi ekim alanları sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında kırmızıörümcek aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde ilaçlı mücadele sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandığında tamamı uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ORENTAL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ORENTAL**'in aynı üretici sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd.Şti.

cansa

ORENTAL

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	23	AKARİSİT (KIRMIZIÖRÜMCEK İLACI)
-------	----	------------------------------------

240 g/l Spiromesifen

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile temas halinde: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gözünüzde lens varise hemen çıkarın ve 15-20 dakika boyunca yıkayın. Hemen bir doktora başvurun.

Yutulması halinde: Kusturmayınız. Bol su içiriniz. Tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde: Elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Solunması halinde: Hasta solunumda güçlükle çekiyorsa hemen temiz havaya çıkarın. Hemen suni teneffüs uygulayın. Vakit kaybetmeden acil yardım ekibini arayın ve bu ilacı etiketini sağlık ekibine gösterin.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Belirtilere göre tedavi uygulanır.Özel bir antidotu yoktur. Kaza durumunda kendinizi iyi hissetmiyorsanız etiket ile birlikte doktora başvurun.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ilaç ambalajı başka amaç için kullanılmamalı,usulüne uygun olarak imha edilmelidir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39 34956

Tepeören-Tuzla / İST.

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax:(0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

Sezayi İSTEK
SORUMLU MÜDÜR

05-01-2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı