

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su :

Özellikleri ve etki şekli :

Emamectin benzoate,yapraklarda beslenen Lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup larvalarda sinir uyarılarını bloke eder.Bu durumda,larvaların beslenmesi hemen durur ve paralyze olurlar.Maksimum larva ölümleri dört gün içinde gerçekleşir.**PRIDOR 5 SG**,güçlü bir mide zehiri olup kontak etkiye de sahiptir.Organik fosforlu pretroidler ve IGR'lara dayanıklılık kazanmış zararlılara da etkilidir.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Biber (Tarla)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/ da (Larva)	7 gün
Biber (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/ da (Larva)	7 gün
Domates (Sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/100 L su (Larva)	7 gün
Domates (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/100 L su (Larva)	7 gün
Hıyar (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 L su (Larva)	7 gün
Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 g/da (Larva)	21 gün
*Bağ	Bağ salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	25 ml/100 L su (Larva)	7 gün
Patlıcan (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 L su (Larva)	7 gün
Karanfil (kesme)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 L su (Larva)	-----
Karanfil	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/100 lt su (Larva)	-----

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

LARIS TARIM

PRIDOR 5 SG

Suda Çözünen Granül (SG)

GRUP	6	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	---	--------------------------

%5 Emamectin benzoate

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız .

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Göz bebeklerinde büyüme,kasların kontrolsüz hareketi ,Kas titremesi,

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114

Dr. Nesrin ÇAKIR
İlaçe Başkan V.

09 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER

Emamectin Benzoate ; Sodyum lauril sülfat

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H371 Organlarda hasara yol açabilir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260 Tozunu solumayın

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz

ve yüz koruyucu kullanın

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi

hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA

MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/

hekimi arayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile 1

dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa,

kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre

bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik

riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Laris Tarım
Ziraat Mühendisi

Laris Tarım
Ürünleri İth. ve Tic. Ltd. Şti.
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:
Böl.:25 34398 Maslak-Şişli-İSTANBU'
Marmara Kurumlar V.D. 582 034 4207

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Biber, Patlıcan, Hiyarda yaprakkurduna karşı:Köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Domateste yeşil kurta karşı : Tarlaya köşegenler yönünden girilip tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Bağda salkım güvesine karşı: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı. Asmanın fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Karanfilde pamuk yaprakkurduna ve yeşil kurda karşı : Üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya 1 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir. Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için 1-3. dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İlerki dönemde ki larvalara karşı yapılan uygulamalardan yeterli sonuç beklenmez.

LARIS TARIM

PRIDOR 5 SG

Suda Çözünen Granül (SG)

GRUP	6	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	---	-----------------------------

%5 Emamectin benzoate

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Yutulması halinde

Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. Hastayı kusturmaya çalışmayınız.

Göz ile temas halinde

Göz ile teması halinde göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaç ile temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız.

Solunması halinde

Hastayı temiz havaya çıkarınız. Sıcak ve sakın tutunuz. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur.

Belirtilere göre tedavi uygulanır.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız. Balıklara zehirlidir. Yer üstü ve yeraltı sularına bulaştırmayınız.

Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Bitki koruma ürünün ve artıklarını havuz, akarsu ve göl bulaştırmayınız.

Rüzgarla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanma. Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

LARIS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:1/25 kat:4
Maslak-İstanbul/Türkiye
Tel : (0 212) 346 07 77 Fax : (0212) 346 07 80

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Hakan AYDOĞAR
Zincirli Mühendisi

Laris Tarım

Ürünleri İth. ve Tic. Ltd. Şti.
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat: 4
Böl.:25 34398 Maslak-Şişli-İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D. 582 034 -2017

Pamukta Yeşil kurta karşı: Pamuğun taraklanma devresinde yumurta

populasyonunun artmaya başladığı dönemde örneklemeye başlanır. Örnekleme için 50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite kabul edilir ve yaklaşık olarak birbirine eşit üç bölüme ayrılır. Her bölümde rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda ilaçlı mücadeleye karar verilir.

Ancak, temel gelişme dönemi olarak adlandırılan bu dönemde, zararlının birinci dölüne karşı yapılacak ilaçlamalarda, bitkinin yeni taraklar oluşturarak kendisini yenileme özelliği ve doğal düşman durumu göz önüne alınarak, ilaçlamaya karar verilmelidir. Bırakılan yumurta sayısı arttığı sürece ilaçlama yapılmamalıdır. Ancak bu süre Yeşilkurt larvalarının çok fazla büyümesine olanak verecek kadar uzun olmamalıdır. İlaçlı mücadelede en iyi etkiyi elde etmek için her dölde yumurtadan yeni çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu dönem iyi belirlenmelidir. Larvalar gündüzleri genellikle tarak, çiçek ve koza içinde beslendiği için ilaçlama sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yapılmalıdır.

Bitki tahammülü : Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ : PRIDOR 5 SG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir akariisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PRIDOR 5 SG 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU :

Büyük miktarlarda karışım yapılmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir..

LARIS TARIM

PRIDOR 5 SG

Suda Eriyebilir Granül (SG)

GRUP	6	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	---	-----------------------------

%5 Emamectin benzoate

RUHSAT SAHİBİ FİRMA :


LARIS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC. LTD.ŞTİ.
Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:1/25 kat:4
Maslak-İstanbul/Türkiye
Tel : (0 212) 346 07 77 Fax : (0212) 346 07 80

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Hakan AYDOĞAR
Ziraat Mühendisi

Laris Tarım
Ürünleri İth. ve Tic. Ltd. Şti.
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:
Böl.:25 34398 Maslak-Şişli-İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D. 582 034 4267



09 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.