

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :

Sarj No:

Ruhsat tarih ve No.su : 27.06.2012/8758

KULLANILACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre (gün)
Armut	Armut Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	150 g/100 L su	3 gün
Elma	Elma Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	150 g/100 L su	3 gün
Erik	Cep hastalığı (<i>Taphrina pruni</i>)	300 g/100 L su	3 gün
Şeftali	Sert çekirdeklili meyvelerde çiçek moniliyası (<i>Monilia laxa=Sclerotinia laxa</i>)	300 g/100 L su	3 gün
Kiraz, Vişne	Sert çekirdeklili meyvelerde çiçek moniliyası (<i>Monilia laxa=Sclerotinia laxa</i>)	300 g/100 L su	3 gün
Şeftali Kayısı	Sert çekirdeklili meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	300 g/100 L su	3 gün
Turunçgiller	Turunçgil meyvelerinde Kahverengi çürüklik ve gövde zamkanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	300 g/100 L su (Meyve enfeksiyonları)	7 gün
Yeni dünya	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i> var. <i>eriobotryae</i>)	300 g/100 L su	3 gün
Bağ**	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 g/100 L su	3 gün
	Ölü Kol * (<i>Phomopsis viticola</i>)	250 g/100 L su (Yaz uygulaması)	3 gün
Sebze fideleri***	Kök çürüklüğü (çökerten) (<i>Phytophthora spp.</i> , <i>Phythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	200-250 g/100 L su	--
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	300 g/100 L su	7 gün
	Yaprak küfü (<i>Cladosporium fulvum</i>)	250 g/100 L su	7 gün

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
27 Nisan 2019
KABUL EDİLMİŞTİR.



PLATIN CAPTAN 50 WP

Islanabilir Toz İlaç (WP)

GRUBU	M:4	FUNGİSIT (Mantar İlacı)

% 50 Captan

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınuz

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınuz.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
ZEHIRLENME BELİRTİLERİ:**

Deri, göz, burun ve boğazda tahrış yapabilir.

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER

Captan

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



Uyarı kelimesi : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H331 Solunması halinde toksiktir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P261 Tozunu solumaktan kaçının.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulmayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın.

**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

Arılarla zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınuz.

Bahklara zehirlidir. Yer östü ve yeraltı sularına bulaştırmaktan kaçınız.

Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Bitki koruma ürününü ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.

Rüzgarla sürüklennenin olabileceği havalarda kullanmayın.

Boş ambalajları usulune uygun imha ediniz.



Marul	Mildiyö (<i>Bremia lactucae</i>)	300 g/100 L su	7 gün
Soğan	Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	300 g/100 L su	7 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	350 g/100 L su	7 gün
Karanfil	Pas (<i>Uromyces caryophyllus</i>)	250 g/100 L su	7 gün
Domates	Sebzelerde kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	250 g/100 L su	7 gün

--Tüketicim amaçlı bağı yaprağı hasadı yapılacak bağı alanlarında kullanılmaz.
***Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir..Hazırlanan Bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır

KALİBRASYON:Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püsürkme sistemini karıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

KULLANIM ŞEKLİ :

Armut karalekesi :

1.uygulama :Dal sırası yok ise **1.uygulama** çiçek gözleri kabardığında

2.uygulama :Beyaz rozet döneminde **3.uygulama:** Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce ,**4. ve diğer uygulamalar :**ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün ara ile yapılır



PLATIN CAPTAN 50 WP

Islanabilir Toz İlaç (WP)

GRUBU	M:4	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	-----	----------------------------

% 50 Captan

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktor çağırınız. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte gösteriniz. Hastayı kusturmaya çalışmıyoruz. Bilinci yerinde olmayan hastaya ağızdan bir şey vermeyiniz.

Göz ile temas halinde

Gözü ciddi şekilde tahrîş eder. İlaç göz ile temasından sonra derhal temizlenmelidir. Aksi takdirde kalıcı hasar olacak şekilde göz dokusuna zarar verir. Derhal tıbbi yardım alınınız.

Deri ile temas halinde

Uzun süre temas halinde tahrîş neden olur. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız. İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız.

Solunması halinde

Hastayı temiz havaya çıkarınız. Nefes almayıorsa suni teneffüs yapınız. Doktor çağırınız

ANTİDOTO VE TEDAVİSİ : Toksisitesi düşük olup özel bir antidot yoktur.belirtilere göre tedavi uygulanır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal,kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans)sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt
No :21/26 Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı /ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
27.01.2014

Elmada Karalekesi : Dal sırası yok ise **1.uygulama** : Çiçek gözleri kabardığında
2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı göründüğünde)
3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökültünce **4. ve diğer uygulamalar :** ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda
10 gün ara ile yapılır

Eriklerde cep hastalığı: **1.uygulama** tomurcukların kabardığı dönemde,
2.uygulama çiçek taç yapraklarının%80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde Çiçek Moniliyası (Şeftali,Kiraz,Vışne) :
1.uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.uygulama : Tam çiçeklenme döneminde (%90-100 çiçekte) yapılır

Şeftali yaprak denle (Çil) : **1.uygulama** sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra
2.uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde çiçekler açılmadan önce
yapılır .

Kayısı yaprak denle (Çil): **1.uygulama** sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2.uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu
döneminde) **3.uygulama** meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası,meyve ucuna
siyirlirken yapılmalıdır.

Turuncgil meyvelerde kahverengi çürüklük ve gövde zamkanması:

Meyve enfeksiyonlarına karşı

1.uygulama sonbaharda yağışları başlamadan önce yapılmalıdır. **2.uygulama** Havalarda
yağışlı giderse **1.uygulamadan 15 gün** sonra yapılmalıdır.

Gövde enfeksiyonlarına karşı : Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim,ocak ve mart
aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir.

Yeni dünya karaleke:**1.uygulama** : Sonbaharda çiçek tomurcukları kabardan önce

2.uygulama çiçek tomurcukları açılmadan önce **3. uygulama** çiçek taç yapraklarının
dökülmesinden sonra **4. ve diğer uygulamalar** **3.uygulamadan hasada 20 gün** kahncaya
kadar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Bağ ölükol :*Yaz uygulaması:**1.uygulama** Sürgünler 2-3 cm olduğunda **2.uygulma**
Sürgünler 8-10 cm olduğunda **3. uygulama** Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede
yapılmalıdır.

Bağ Mildiyösü :

1. Uygulama: Sürgünler 23-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve sonra uygulamalar 1. Uygulama süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik
faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Sebzelerde kök çürüklüğü(Çökerten): Fidelikte hastalık görüldüğünde uygulamaya
başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla uygulama yapılır.

Domates mildiyös : İlaçlı mücadeleye Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında
kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi örtünün görülmESİyle ve hastalığın her
yıl çıktıgı yerlerde hastalık için uygun kooşular görüldüğünde uygulamaya
başlanır.Hatsahığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklala uygulamaya
devam edilir..

Domates yaprak küfü:Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya
başlanır.Uygulamalar 10-15 gün ara ile tekrarlanır.Hasada 15-20 gün kala uygulama
kesilmelidir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: 2019
KABUL EDİLMİŞTİR.



PLATIN CAPTAN 50 WP

Islanabilir Toz İlaç (WP)

GRUP	M:4	FUNGİSIT (Mantar İlacı)

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:
PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.AŞ
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt
No:21/26 Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:
PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.AŞ
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı /ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

21.07.2018 ARSLAN
Platin Kimya
Hümessilik ve Diş Ticaret A.Ş.

Mehmet Arslan
Umut Umut BANÇE
Daire Başkan V.

Marul Mildiyösü : Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır.Mildiyö görüldüğünde hasta kısımları toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin tarlaya şartırılmasına kadar uygulamalar sürdürülmelidir.Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalıdır,birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir.Fidelikte uygulama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır. İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır,birer hafta ara ile hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilir.

Soğan Mildiyösü : Günlük ortalama sıcaklığın 16 °C ulaşması ve orantılı olarak %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gereklidir.Çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalarına başlanabilir.

Patates Mildiyö : Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Karanfil Pası : Çelikler sıraya geçirilmeden önce uygulamaya başlanmalı ve 10 'ar gün ara ile uygulamalar yapılmalıdır

Sebzelerde kurşunu küf(domates) : Çevrede hastalık ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır.uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır..

Karanfil Pası : Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10 'ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.

Patates Mildiyö : Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :PLATIN CAPTAN 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için PLATIN CAPTAN 50 WP 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayı onaylıyor.Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISABILIRLİK DURUMU:

Diger bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
İlalat 2019



PLATIN CAPTAN 50 WP

İslanabilir Toz İlaç (WP)

GRUP	M:4	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	-----	----------------------------

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:
PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş

Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt

No :21/26 Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde

No: 38 Döşemealtı /ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Selim AŞSLAN
Platin Kimya
İmperial MÜMESSİLLİK ve Diş Ticaret A.Ş.

