

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO : 04.12.2007 / 6192

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA:

BİTKİ ADI	KULLANIM ETKİSİ	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
PAMUK	Aşırı büyümeyi önler, erkencilik sağlar.	100 ml/da Çiçek doruğu arasında veya tarak başlangıcından itibaren 25-50 ml/da 10-15 gün ara ile 3-4 tatbikat
SOĞAN VE SARIMSAK	Verim artışı sağlar.	100 ml/da Tohumdan üretilen soğanda ekimden 3-3,5 ay sonra, soğan 4-5 yapraklı iken, Arpacıktan üretilen soğanda yaklaşık 2,5 ay sonra
YERFISTIĞİ	Verim artışı sağlar.	150 ml/da Çiçek başlangıcı ile tam çiçeklenme döneminde

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta Kullanılması: CANPİKS pamukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve gelişmeyi düzenler.

CANPİKS' in Sağladığı Yararlar: Koyu yeşil yaprak rengi, boğum aralarının kısalması ile buna bağlı olarak derli toplu bir bitki olur, böylece sıra araları daha geç kapanır. Güneş ışınları bitkiye daha iyi nüfuz eder ve alt dallardaki kozalara kadar ulaşır. Bitkinin alt kısımlarında daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşur ve böylece koza çürüklüğü önemli ölçüde azalır. Haşere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarak yapılabilir. Daha az tarak ve elma dökümü, daha iri kozlar, kozaların daha erken olgunlaşması ve erken hasat olur.

CANPİKS' in Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar:

CANPİKS' in etkilerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için;

- Pamuk tarlalarında yabancı ot mücadelesi ve haşere mücadelesi zamanında yapılmalıdır.
- Bitkinin normal gübre ihtiyacı karşılanmalıdır ve normal sulama düzenine uyulmalıdır.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)



Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	-	BGD
-------	---	-----

50 g/L Mepiquat Chloride

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ ¼'Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

15 Mart 2023

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Mepiquat Chloride

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına bulaştırmayınız.

-Arılara zehirlidir.

-Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz.

Başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.

-İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. A.Ş. B. Bölge Kurulmanı
No: 39 4966 Zeynep-Tuzla / İSTANBUL
Yatırım V.D. 202 001 2827
Sermaye: 3.100.000 TL
Sezayi İSTEK
SORUMLU MÜDÜR

CANPIKS' in Uygulama Zamanı:

En uygun kullanma zamanı çiçeklenme başlangıcı ile bunu takip eden iki haftalık süre içerisinde. Yukarıda belirtilen uygulama zamanı sulama imkânına göre 3-5 gün önceye veya sonraya alınabilir.

CANPIKS' İN UYGULAMA DOZU:

Genel olarak bir defada ve 100 ml'da dozda uygulanır. Uygulanan tarlada normal derecede vejetatif gelişme olursa, birinci tatbikattan 3-4 hafta sonra 50 ml'da dozda ikinci bir uygulama yapılması tavsiye edilir.

PARÇALI UYGULAMA:

CANPIKS' in yüksek dozda bir defa kullanımı yerine bu dozun 3 veya 4' e bölünerek pamuğun tarak döneminden itibaren düşük dozlarda da kullanımı mümkündür. Böylece CANPIKS tarak başlangıcından itibaren b tkiyi kontrol altına alır ve tarak dökülmesini azaltır. Parçalı uygulama sayesinde sulama imkânı kısıtlı veya boylanmayan pamuklarda da CANPIKS kullanılabilir ve CANPIKS' in sağladığı faydalardan yararlanılabilir.

PARÇALI UYGULAMADA CANPIKS'İN DOZLARI:

1. Uygulama: 25 ml'da (Tarak başlangıcı)
2. Uygulama: 25-50 ml'da (1. suyun önüne veya gelişme zayıfsa sudan sonra)
3. Uygulama: 25-50 ml'da (2. uygulamadan 7-14 gün sonra veya 2. suyun önüne)
4. Uygulama: 25 ml'da (Pamukta büyüme devam ediyorsa yapılır.)

CANPIKS yer aletleri ile dekara en az 20 lt. su atılmalıdır veya uygulama zamanı diğer haşere ilaçlarını uygulama zamanına tesadüf ediyorsa CANPIKS haşere ilaçları ile karışım halinde kullanılmalıdır.

SOĞAN VE SARIMSAKTA KULLANILMASI:

CANPIKS soğan ve sarımsakta verim artışı sağlar.

KULLANIM ZAMANI:

Tohumdan baş soğan üretiliyorsa, CANPIKS' in en uygun kullanım zamanı ekimden 3-3,5 ay sonradır. Bu dönemde soğan genellikle 4-5 yapraklı olup, 20-25 cm boyundadır ve baş bağlamaya başlamıştır. Arpacıktan baş soğan üretiliyorsa, CANPIKS' in kullanım zamanı arpacık ekiminden yaklaşık 2,5 ay sonradır. CANPIKS' in sarımsakta kullanma zamanı arpacık soğanda olduğu gibidir. Gerek soğan gerekse sarımsakta dikkat edilmesi gereken husus, CANPIKS' in baş bağlama başlangıcında kullanılmasıdır.

YERFİSTİĞİNDE KULLANIMI:

CANPIKS yerfistiğinde verim artışı sağlar. Yapılan denemeler verim artışının %25-30 oranında olduğunu göstermiştir. CANPIKS yerfistiğinde çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçek dönemi arasında kullanılabilir. En iyi netice tam çiçeklenme döneminde yapılan uygulamalardan alınmıştır. CANPIKS yerfistiğinde bir defada ve 150 ml'da dozda kullanılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

CANPIKS hiçbir ilaçla karıştırılmadan kullanılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

15 Mart 2023

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

CANPIKS

BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ (BGD)

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	-	BGD
-------	---	-----

50 g/L Mepiquat Chloride

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

GÖZ: Cilde temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

YUTMA: Kusturmayınız. Bol su içiriniz. Tıbbi yardım alınız.

CİLT: Cilde temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

SOLU: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:
Baş ağrısı mide bulantısı halsizlik.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114
(SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ)

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak serin ve kuru şartlarda depolandığında imal tarihinden itibaren 2 yıl müddetle kullanılır.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.S.B. Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören Tuzla / İSTANBUL
Yatırım V.D. 02 001 2827
Sermaye: 1.100.000 TL
Sezai İSTEK
SORUMLU MÜDÜR